

**Telazol®****Cloridrato de Zolazepam e  
Cloridrato de Tiletamina****USO VETERINÁRIO****VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.****ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.****Injetável**

Anestésico geral para cães e gatos

**Fórmula:**Cada frasco-ampola com liofilizado contém:  
Zolazepam (cloridrato) ..... 250,0 mg\*  
Tiletamina (cloridrato)..... 250,0 mg\*\*  
Veículo q.s.p. .... 956,0 mg

\* equivalente em Zolazepam base

\*\* equivalente em Tiletamina base

**Diluyente:**

Cada frasco contém:

Água destilada estéril ..... 5,0 mL

**Indicações:**

Como anestésico para uso em cães e gatos sadios, por ocasião de intervenções cirúrgicas que durem entre 30 e 60 minutos. Em gatos, é indicado para contenção ou para anestesia combinada com relaxamento muscular e em cães para contenção e pequenas intervenções cirúrgicas de curta duração (em média 30 minutos), que requeiram analgesia suave à moderada. Consideram-se pequenas cirurgias os reparos de lacerações, drenagem de abscessos, castração, etc.

**Via de aplicação:**

Administrar por via intramuscular profunda.

**Posologia e Modo de usar:**

As doses do produto são expressas em mg da combinação das duas drogas. Para reconstituição, transferir o diluyente para o frasco com liofilizado com seringa estéril e agitar suavemente. Depois de reconstituído, Telazol® contém 100 mg da combinação das drogas ativas por cada mL.

**Cães:** em cães sadios, é indicada uma dosagem inicial de 6,6 a 9,9 mg/kg para fins de diagnóstico e a dosagem de 9,9 a 13,2 mg/kg para pequenos procedimentos cirúrgicos de curta duração, como tratamento de lacerações e ferimentos, castração, etc, que requeiram analgesia suave à moderada. Quando forem necessárias doses suplementares de Telazol®, estas deverão ser menores que a dose inicial e as duas doses somadas (inicial + suplementar) não deverão exceder o limite de 26,4 mg/kg. Os melhores resultados da anestesia com Telazol® são obtidos quando os procedimentos são feitos dentro de uma hora, com aplicação de dose única. A fim de manter uma margem de segurança de 2x em cães, o uso do produto é recomendado em procedimentos que podem ser feitos com doses baixas.**Gatos:** em gatos sadios, uma dosagem inicial de 9,7 a 11,9 mg/kg é recomendada para procedimentos odontológicos, tratamento de abscessos, remoção de corpo estranho e cirurgias relacionadas. Para pequenos procedimentos, recomenda-se uma dosagem de 10,6 a 12,5 mg/kg para obter um estado de analgesia suave à moderada, requerida para o tratamento de lacerações, castrações e outros procedimentos de curta duração. Dosagens iniciais de 14,3 a 15,8 mg/kg são recomendadas para ovariosalpingohisterectomia e extrações de unha. Quando doses suplementares forem requeridas, estas devem ser inferiores à dose inicial e as duas doses somadas não devem exceder o limite da dosagem de segurança de 72 mg/kg.

O produto reconstituído e não utilizado, quando mantido em temperatura entre 20°C a 30°C, deve ser desprezado após 4 dias e quando mantido em refrigerador, após 14 dias.

**Contra-Indicações:**

Telazol® é contra-indicado para cães e gatos portadores de disfunções pancreáticas, cardiovasculares severas, pulmonares e renais.

Não foram estudados os efeitos do produto sobre o feto, razão pela qual o produto não é recomendado para fêmeas em gestação.

**Precauções e Efeitos colaterais:**

Reduzir a dose em pacientes idosos ou debilitados. Como a excreção do produto ocorre predominantemente pelos rins, uma patologia renal pré-existente ou prejuízo da função renal podem resultar em duração mais prolongada da anestesia e nestes casos, a dosagem deve ser reduzida. Telazol® não deve se utilizado em gatos com insuficiência renal. Como Telazol® transpassa a barreira placentária produzindo depressão respiratória no recém-nascido, os riscos da utilização em cesarianas devem ser avaliados pelo Médico Veterinário. Foram registrados alguns óbitos em cães e gatos após administração de Telazol®, atribuídos à doenças pulmonares e renais pré-existentes na necrópsia. Entretanto, a morte foi atribuída ao uso do produto em um cão dentre 1072 animais e em um gato dentre 1095 animais. Gatos, assim como cães de raças pequenas com pequena massa corporal em relação à superfície corporal, deverão ser protegidos de perda de calor durante a anestesia com Telazol®. A temperatura corporal deverá ser monitorada e calor suplementar poderá ser necessário para controlar a hipotermia. Como acontece com outros anestésicos, recomenda-se hemostasia durante qualquer procedimento cirúrgico.

Durante a anestesia com Telazol® poderão ocorrer movimentos atetóides, que não devem ser confundidos com falta de anestésico nem encarados como indicativo de falta de analgesia. Atropina, na dose de 0,04 mg/kg pode ser utilizada para combater o ptialismo que pode ocorrer durante a anestesia com Telazol®.

**Interações medicamentosas:**

Derivados Fenotiazínicos devem ser avaliados quando utilizados concomitantemente ao Telazol®, pelo fato dessa associação poder produzir depressão respiratória e miocárdica, hipotensão e hipotermia. O Telazol® associado ao Cloranfenicol produz aumento na duração da anestesia em gatos.

**Apresentação:** Frasco-ampola com liofilizado acompanhado de ampola diluyente com 5 mL.

Venda sob prescrição obrigatória e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

**Cuidados:**

Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o no 6279 em 09/02/98.

**Validade do produto:** 24 meses após a data da fabricação.**Fabricante do Diluyente:****Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.**  
Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701  
Vila Boa Vista - Campinas - SP**Proprietário e Fabricante do Liofilizado:****Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.**  
Ctra. Camprodón s/n "La Riba"  
17813 Vall de Bianya (Girona) - Espanha